

Rubus armeniacus

Armenische Brombeere aus dem Kaukasus



Pflanze

Wintergrün, bis 3 m hoch¹¹

Blätter

Handförmig geteilt⁸, fein gesägt, unterseits grau bis weissfilzig, oberseits fast kahl, 5-zählig⁹

Stängel

Schösslinge 10-30 mm dick, bis 6 m lang, behaart, mit auffallenden roten Kanten und Stachelbasen (junge Triebe anschauen, bei älteren ist ganze Sprossachse rot, wenn starkem Sonnenlicht ausgesetzt)¹¹

Blüten

Blütezeit: Juni bis Juli¹¹

Blassrosa¹¹, 14-20 mm lang⁹

Früchte

Schwarze Beeren¹¹



Blüte

Blassrosa, Kronblätter 14-20 mm lang



Frühlingssprossling

Typisch: sehr kräftig & kantig



Schössling

Teils rote Kanten

Basis der Stacheln rot gefärbt, in starkem Kontrast zur grünen Farbe der Sprösslingsachse⁸ und der hellen Stachelspitze.



Blattunterseite grau bis weiss filzig

Standort

Gebüsche, Hecken, Waldränder, Waldschläge, Pionierwälder und ruderales Brachen. Lichtliebend, wärmeliebend, auf nährstoffreichen Böden⁸.

Ausbreitung

Durch Beeren (werden von Vögel gefressen)

Bekämpfung

Kombinierte, mehrjährige Bekämpfung mittels Mähen der oberflächlichen Biomasse und anschließendem Ausstocken der Mutterknollen. Dabei darauf achten, dass Pflanzen nur kniehoch gemäht werden, damit Haupttriebe fürs Ausstocken einfach aufgefunden werden. Wiederholte Mahd kann Bestand reduzieren.