

Galega officinalis

Geissraute aus Eurasien & Afrika



Pflanze

Krautige Pflanze, 30-80 cm hoch, kahl¹¹

Blätter

Mit 5-8⁸(-12) Fiederpaaren, Teilblättchen schmal, lanzettlich, mit aufgesetztem Spitzchen⁸

Stängel

Aufrecht, gerieft, hohl⁸

Blüten

Blütezeit: Juni bis Juli¹¹

Hell-lila bis weiss¹¹, bläulich weiss⁸, in aufrechten, langgestielten, lockeren und vielblütigen Trauben^{8,11}

Früchte

Längliche, zylindrische Schoten, gerade, 2-5 cm lang und 2-3 mm dick, vielsamig¹¹



Teilblätter

mit aufgesetztem Spitzchen



Nebenblätter

pfeilförmig zugespitzt,
nicht verwachsen

Verwechslungsmöglichkeiten



Securigera varia (Bunte Kronwicke), einheimisch
kopfige Dolde (Blütenstand wie ein "Kronchen")
Nebenblätter 2 abgerundete Lappchen



Vicia einheimische Wicken: Haben Ranken an Blattenden



Onobrychis viciifolia (Saat-Esparsette), Neophyt⁸, Ursprung Südosteuropa), Blüten kräftig rosa, Früchte einsamig, rundlich, eiförmig, gezählter Kamm⁸



Astragalus glycyphyllus (Süßer Tragant), einheimisch, weniger Fiederpaare (4-6), Blüten gelb-grün, Teilblätter unterseits zerstreut behaart, oberseits kahl, Früchte etwas aufwärts gebogen⁹, vielsamig.

Standort

Feuchte, nährstoffreiche Staudenfluren, Kratusäume, Flussufer⁸ / Auenwälder¹¹

Ausbreitung

Durch Hülsenfrüchte

Bekämpfung

Ausstocken der Altpflanzen samt Pfahlwurzeln. Mind. 3x jährlich kontrollieren und Keimlinge konsequent ausreissen/ausjäten. Jahrelange Bekämpfung und Nachkontrolle.